

Samenstelling van de therapie

CVP is een chemotherapie behandeling die bestaat uit 2 celdodende geneesmiddelen (Cyclofosfamide en Vincristine) die via een infuus worden toegediend, in combinatie met medicatie prednisone. Prednisone is een corticosteroid dat het effect van de chemobehandeling versterkt en bepaalde neveneffecten (o.a. misselijkheid) vermindert. De behandeling wordt vaak toegediend met rituximab (men spreekt dan van R-CVP).

(R-)CVP behandeling wordt voorgeschreven voor de behandeling van bepaalde vormen van lymfeklierkanker (lymfoom).

Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en de behandeling wordt op de eerste dag van elke cyclus toegediend. Prednisone wordt gedurende de eerste 5 dagen van elke cyclus ingenomen. (Zie hiervoor het schema op de volgende pagina).

Vooraleer U een cyclus wordt toegediend, wordt uw bloedbeeld steeds uitgebreid gecontroleerd.

| Product | Week 1, dag: | | | | | | Week 2, dag: | Week 3, dag: |
|-----------------------|--------------|---|---|---|---|-----|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-14 | 15-21 |
| (Rituximab) | | | | | | | | |
| Cyclofosfamide | | | | | | | | |
| Vincristine | | | | | | | | |
| Prednisone | | | | | | | | |

De therapie wordt meestal toegediend langs een ader in de arm. Indien U heel fijne aders heeft, kan uw behandelend hematoloog U voorstellen dat de behandeling via een centraal veneuze katheter wordt toegediend. Dit is een buisje dat geplaatst wordt in een grote ader onder het sleutelbeen. Klik [hier](#) voor de infobrochure centraal veneuze katheter.

Na de behandeling zal U ondersteunende medicijnen meekrijgen. Deze omvatten o.a. een maagbeschermer, medicijnen tegen misselijkheid en braken, prednisone etc. Het is belangrijk dat U deze correct inneemt volgens de medicatiefiche die U bij ontslag zal meekrijgen.

Plaats van de toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Verlies van smaak, klik [hier](#)
- Constipatie, klik [hier](#)
- Slijmvliesontstekingen, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Tekorten aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Tekort aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Tintelingen in de handen en voeten, klik [hier](#)
- Branderig gevoel bij het plassen
- Haarverlies (dit is meestal beperkt), klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

(R-)CVP behandeling kan gepaard gaan met een branderig gevoel bij het plassen. Dit wordt veroorzaakt door cyclofosfamide. Het is aangewezen de eerste 3 dagen na behandeling voldoende te drinken : minimaal 1.5L water per dag.

Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier