

Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): carboplatinum (Carboplatine®). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Verloop van de therapie

Deze chemobehandeling wordt toegediend via een veneuze katheter. Deze katheter wordt geplaatst de ochtend van de opname. Dit gebeurt door de verpleegkundige op de kamer zelf. De katheter wordt de dag zelf na het beëindigen van de chemobehandeling opnieuw verwijderd.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw. Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op Carboplatine®. In dit geval kan een overnachting noodzakelijk zijn.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Een verminderd aantal rode of witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Een verminderd aantal bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Smaakverandering, klik [hier](#)
- Haarverlies, klik [hier](#)
- Ontsteking van het mondslimvlies, klik [hier](#)
- Diarree of obstipatie, klik [hier](#) of klik [hier](#)
- Griepachtige verschijnselen, klik [hier](#)
- Tintelingen en voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik [hier](#)
- Oorsuizingen en verminderd gehoor, klik [hier](#)
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik [hier](#)
- Tijdelijke huiduitslag, klik [hier](#)

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reactie op de chemotherapie, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

- Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie in met medrol omdat deze medicatie de nevenwerkingen van de chemotherapie vermindert. U krijgt deze medicatie mee vanop de afdeling.

Meld het aan uw arts of verpleegkundige als u de medicatie bent vergeten.

U neemt uw medicatie in volgens volgend schema:

Dag	Plaats	Tijdstip	Product
1	Dagkliniek	8u	Chemotherapie
2 + 3	Thuis	8u	1 co medrol 32mg

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

- Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Contactgegevens Dienst Oncologie

Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman