

Afdeling
**Radiotherapie
Oncologie**

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Brachytherapie



Inwendige bestraling van de vagina

(Na voorafgaande verwijdering van de baarmoeder).

U heeft van uw radiotherapeut vernomen dat u een inwendige bestraling (brachytherapie) dient te krijgen. Met deze informatiefolder willen wij u nader inlichten over deze behandeling en de voorbereiding ervan.

Doel

Het doel van deze bestraling is een dosis bestraling leveren ter hoogte van de vaginale koepel zonder dat blaas en darmen hierbij worden belast. Door een radioactieve bron, via een applicator, in de vagina te brengen, worden de omliggende weefsels zoveel mogelijk gespaard. Deze inwendige bestraling kan al dan niet in combinatie gegeven worden met uitwendige bestralingen.

- Indien u enkel inwendige bestraling krijgt, dan krijgt u een datum voor de voorbereiding en de drie afspraken voor de inwendige bestraling, telkens met 1 week rust om eventuele reacties te vermijden.
- Indien u inwendige in combinatie met uitwendige bestraling krijgt, dan krijgt u de afspraken voor de inwendige bestraling mee in de week van de laatste uitwendige bestralingen. Eveneens krijgt u de datum van de voorbereiding en de drie afspraken voor de inwendige bestraling, telkens met 1 week rust om eventuele reacties te vermijden.

Voor deze behandeling hoeft u niet te worden opgenomen. Na de bestraling kan u gewoon terug naar huis.

De voorbereiding

De voorbereiding van de inwendige bestraling gebeurt enkele dagen voor de inwendige bestraling op de CT-simulator. Eerst zal men u vragen om eens te plassen om de blaas te ledigen. Vervolgens plaatst de arts de vaginale applicator. Dit is vrijwel steeds pijnloos. Deze voorbereiding kan u een vervelend gevoel geven, maar vraagt geen verdoving. Eveneens zal de arts u bij de eerste consultatie een voorschrift meegeven voor suppo's of een klein lavement, te gebruiken bij de voorbereiding en bij elke bestraling.

Na de voorbereiding worden de nodige foto's genomen. Het is belangrijk dat u op dat ogenblik rustig blijft liggen en vooral niet beweegt. Nadat alle foto's zijn genomen worden de applicator en de sondes verwijderd.

De inwendige bestraling

De inwendige bestraling start nadat de berekeningen zijn afgerond. Doorgaans duurt dit een vijftal werkdagen. Op de dag van start wordt u dan naar de behandelingskamer (bunker Versa) gebracht en neemt plaats op een gynaecologische behandeltafel. U wordt verbonden met een vanop afstand bestuurd apparaat dat de radioactieve bron automatisch in de applicator brengt. Op dat ogenblik ben u alleen in de behandelingskamer. De verpleegkundige en de arts blijven contact met u behouden door middel van een camera en parlofoon. De inwendige bestraling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. De gehele behandeling, inclusief de voorbereiding, neemt ongeveer een uur in beslag. Vergeet ook niet een suppo te gebruiken voor elke behandeling.

Na de bestraling wordt het ingebrachte materiaal verwijderd en kan u huiswaarts keren. Een eventuele volgende inwendige bestraling gebeurt op dezelfde wijze.

Eventuele nevenwerkingen kunnen zijn: licht roze vaginaal verlies, irritatie van de blaas en problemen bij het vrijen (info verpleegkundig consulent).

Contactgegevens



Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat

Tel: 053/72.44.79 – Fax: 053/72.44.19

Radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be

Sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werkster: 053/72.40.15

Bestralingstoestellen

- Versato (wachtzaal 8, blok F-1): 053/72.44.07
- Versa (wachtzaal 9, blok F-1): 053/72.42.46
- Novalis (wachtzaal 6, blok F-1): 053/72.87.13
- Unique (wachtzaal 7, blok F-1): 053/72.44.78

CT-simulator

- Wachtzaal 5, F-1 blok: 053/72.43.30

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 04/07/2022

Goedgekeurd door dr. Samuel Bral