

Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen (cytostatica): gemcitabine en cisplatinum. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en omvat twee opnames. De eerste opname start op dag één waarbij u voor twee dagen en één nacht zal opgenomen worden op de dienst oncologie. Dit is noodzakelijk omdat u naast de chemotherapie nog extra vocht krijgt toegediend om de nieren te ondersteunen. De tweede opname start op dag acht van de behandeling en heeft plaats op het oncologisch dagziekenhuis. Overnachting is dan niet nodig.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via de afdeling oncologie (klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.) en het oncologisch dagziekenhuis (klik [hier](#) voor de infobrochure van T6) van het OLV Ziekenhuis in Aalst, beide bevinden zich op de 6^{de} verdiep in het oude gebouw. U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Een verminderd aantal rode of witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Een verminderd aantal bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Haarverlies, klik [hier](#)
- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Smaakverandering, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Ontsteking van het mondslimvlies, klik [hier](#)
- Diarree of obstipatie, klik [hier](#) of klik [hier](#)
- Griepachtige verschijnselen, klik [hier](#)
- Tintelingen en een voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik [hier](#)
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik [hier](#)
- Huiduitslag, klik [hier](#)
- Oorsuizingen en een verminderd gehoor, klik [hier](#)

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reactie op de chemotherapie, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

- Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie in met medrol omdat deze medicatie de nevenwerkingen van de chemotherapie vermindert. Meld het aan uw arts of verpleegkundige als u de medicatie bent vergeten.

U neemt uw medicatie in volgens volgend schema:

Dag	Plaats	Tijdstip	Product
Dag 1+2	Opname	8u	Chemotherapie
Dag 3	Thuis	8u	1 co medrol 32mg
Dag 4	Thuis	8u	1 co medrol 32mg
Dag 5	Thuis	8u	1 co medrol 32mg
Dag 8	Dagkliniek	8u	Chemotherapie
Dag 22	Start nieuwe cyclus		

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

- Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.
- Indien U koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Contactgegevens Dienst Oncologie

Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman