

Samenstelling van de therapie

Nivolumab (Opdivo®) is een immunotherapie: een behandeling die werkt via het immuunsysteem of afweersysteem. De behandeling stimuleert het eigen afweersysteem. Daardoor gaan de eigen afweercellen de kankercellen bestrijden. Het geneesmiddel Nivolumab wordt toegediend in de vorm van een infuus.

Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 2 weken en de behandeling wordt op de eerste dag van elke cyclus toegediend. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Het is belangrijk uw klachten met uw zorgverleners te bespreken.

Bij volgende klachten neemt u nog diezelfde dag contact op met uw (huis)arts:

- Bij diarree en/of buikpijn. (Klik [hier](#))
- Bij ernstige vermoeidheid die niet betert met rusten. (Klik [hier](#))
- Indien u geen water of voeding meer kan innemen.
- Bij ernstige kortademigheid of een benauwd en pijnlijke gevoel op de borstkas.
- Bij ontstaan van verwardheid, spierzwakte of andere neurologische tekens.
- Bij jeuk of huiduitslag. (klik [hier](#))
- Bij het geel worden van de ogen of de huid en een gestoord gezichtsvermogen.

Specifieke richtlijnen

- Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel gebruikt, zeker indien deze geneesmiddelen uw immuunsysteem kunnen onderdrukken. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

- Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

Contactgegevens Dienst Oncologie

Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman