

Verloop van de therapie

Azacitidine wordt als één of twee onderhuidse (subcutane) inspuiting(en) per dag toegediend en dit gedurende 7 opeenvolgende werkdagen. Praktisch gezien betekent dit dat U naar het ziekenhuis dient te komen van maandag t.e.m. vrijdag, het weekend thuis bent en nog 2 inspuitingen krijgt op maandag en dinsdag.

De plaats van inspuiting dient steeds afgewisseld te worden. De inspuitingen worden in de bovenarm, dij of buik toegediend.

Azacitidine wordt toegediend volgens cycli van 28 dagen (zie hiervoor onderstaand schema).

Product	Week 1, dag:							Week 2, dag:			Week 3, dag:	Week 4, dag:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-21	22-28
Azacitidine												

Vooraleer U een cyclus wordt toegediend en tijdens de behandelingen, wordt uw bloedbeeld gecontroleerd.

U gaat medicatie toegediend krijgen tegen het braken. Het is belangrijk dat U deze medicijnen stipt inneemt.

Plaats van de toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Tekorten aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekorten aan bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Tekorten aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Slijmvliesontstekingen, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Hoesten
- Constipatie, klik [hier](#)
- Slapeloosheid
- Diarree, klik [hier](#)
- Verstoorde levertesten

Specifieke richtlijnen

Ter hoogte van de inspuitingsplaatsen kan een huidreactie ontstaan. Dit uit zich meestal door een rode en pijnlijk vlek. Indien dit optreedt kan U behandeld hematoloog U een cortisone zalf voorschrijven.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/03/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier