

## Waarom dit onderzoek?

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van het plaskanaal en de blaas, om eventuele afwijkingen aan het plaskanaal, prostaat of blaas vast te stellen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een rigide of flexibele cystoscoop.

## Vorbereiding

Op zich is er voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Indien het onderzoek onder plaatselijke verdoving zal gebeuren moet u niet nuchter zijn.


Indien het onderzoek onder narcose zal gebeuren moet u 6 uur vooraf nuchter zijn.

Het onderzoek duurt slechts enkele minuten.


# Onderzoek

- U gaat op uw rug op de behandeltafel liggen met uw benen in de steunen.
- De verpleegkundige ontsmet de penis of schede grondig met een desinfecterende vloeistof.
- Vervolgens wordt wat gel in de plasbuis gespoten. Deze gel werkt als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies en beperkt eventuele pijn tot een minimum.
- Het is belangrijk dat u goed ontspannen bent, zodat het onderzoek u het minst mogelijke ongemak geeft.
- De arts brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Hoewel dit inbrengen relatief pijnloos verloopt, veroorzaakt het passeren van de plasbuis bij de sluitspier even een vervelend gevoel.
- De arts inspecteert de plasbuis en de blaas met de cystoscoop.
- Daarna is het onderzoek afgelopen.

## Bij de man



## Bij de vrouw



## Risico's en mogelijke alternatieven

Als bijwerking is het belangrijk om te weten dat u in de eerste uren (in zeldzame gevallen eerste dagen) na het onderzoek een branderig gevoel bij het plassen kan ondervinden.

Ook een beperkte hoeveelheid bloed in de urine is meestal niet abnormaal.

## Resultaat en kans op succes

De uroloog bespreekt het resultaat van het onderzoek samen met u. U krijgt een afspraak mee om terug te komen bij de arts.

## Nazorg

Ter voorkoming van infectie wordt u na de cystoscopie meestal antibioticum voorgeschreven. Indien u toch nog langdurig klachten zou hebben of hoge koorts zou maken, neemt u best contact op met uw uroloog.

- Indien de ingreep onder narcose gebeurde mag u de eerste 24 u:
  - Niet alleen thuis zijn.
  - Geen voertuig/wagen besturen.
  - Geen belangrijke beslissingen nemen/documenten ondertekenen.
  - Geen alcohol drinken.
  - Geen kalmeermiddelen nemen tenzij door arts anders toegelaten.
  - Thuismedicatie herstarten tenzij uw arts dit anders voorschrijft.
- Het is noodzakelijk dat u onder begeleiding van een volwassene het ziekenhuis verlaat.

## Contactgegevens Dienst Urologie

### Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Fax: 053 72 44 11

Urologie.Aalst@olvz-aalst.be

### Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 61 11

Fax: 02 300 62 98

Urologie.Asse@olvz-aalst.be

### Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 21 11

Fax: 054 31 20 59

Urologie.Ninove@olvz-aalst.be

#### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 28/11/2018

Goedgekeurd door dokter Alex Mottrie