


### Samenstelling van de therapie

Venetoclax is een oraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van acute myeloïde leukemie (AML) of chronische lymfatische leukemie (CLL).

Venetoclax remt een eiwit in de kankercel waardoor deze sneller afbreekt.



# Verloop van de therapie

Venetoclax wordt als tablet van 10mg, 50mg of 100mg afgeleverd. De tabletten dienen in één enkele inname ingenomen te worden.

AML		CLL	
Dag	Dagelijkse dosis	Week	Dagelijkse dosis
1	100mg	1	20mg
2	200mg	2	50mg
3	400mg (=onderhoudsdosis)	3	100mg
		4	200mg
		5	400mg (=onderhoudsdosis)

Venetoclax dient ingenomen te worden zonder op te kauwen met een glas water. Het maakt niet uit wanneer U venetoclax inneemt, maar dit gebeurt best op hetzelfde moment van de dag. Het geneesmiddel moet bij de maaltijd worden ingenomen.

Indien U vergeten bent venetoclax in te nemen, mag U de gemiste dosis inhalen indien er minder dan 8 uur verstreken is. Indien er meer dan 8 uur verstreken zijn, slaat U de dosis over. Neem nooit een dubbele dosis de dag erna in. Indien U braakt na inname van venetoclax dient U geen nieuwe tabletten in te nemen.

Venetoclax kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapotheek kan wenden.

# Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

## Frequent

- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Constipatie, klik [hier](#)
- Te kort aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Te kort aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Tumorlyse syndroom

## Specifieke richtlijnen

Venetoclax kan interactie geven met andere geneesmiddelen. Overleg steeds met uw behandelend hematoloog indien uw medicatie gewijzigd wordt.

De werking van venetoclax kan beïnvloed worden door het drinken van (grote hoeveelheden) pompelmoes sap. Probeer dit tot een minimum te beperken. Andere vruchtensappen zijn perfect veilig. Vermijd ook stervrucht (Carambola) en Sevilla-sinaasappelen. Ook Sint-Janskruid (welke gebruikt wordt als plantaardig slaapmiddel) dient vermeden te worden.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

## Contactgegevens Dienst Hematologie

### Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

#### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 04/08/2022

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier