


Samenstelling van de therapie

Acalabrutinib is een oraal geneesmiddel (d.w.z. inname via de mond) dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL). Het geneesmiddel remt een eiwit in de kwaadaardige cel, het Bruton tyrosine kinase (BTK). Hierdoor remt het de groei van de kankercel.



Figuur: Acalabrutinib remt het Bruton tyrosine kinase (BTK) eiwit

Verloop van de therapie

Acalabrutinib dient ingenomen te worden zonder op de capsules te kauwen. Acalabrutinib wordt 2 keer per dag ingenomen met 12u tussen beide innames. Het geneesmiddel mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Indien U vergeten bent acalabrutinib in te nemen, mag U de gemiste dosis inhalen indien er minder dan 3 uur verstreken is. Indien er meer dan 3 uur verstreken zijn, slaat U de dosis over. Neem nooit een dubbele dosis de dag erna in. Indien U braakt na inname van acalabrutinib dient U geen nieuwe capsules in te nemen.

Acalabrutinib kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapotheek kan wenden.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Spierpijn en gewrichtspijn
- Luchtweginfectie
- Hoofdpijn
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Constipatie, klik [hier](#)
- Verhoogd risico op bloedingen
- Tekort aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Huidafwijkingen (droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag)

Zeldzaam

- Hartritmestoornissen en hartkloppingen

Specifieke richtlijnen

De werking van acalabrutinib kan beïnvloed worden door de inname van bepaalde geneesmiddelen. Dit zijn o.a. geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van hartritmestoornissen, bloedverdunners, ontstekingsremmers (zoals Brufen, Voltaren) en maagzuurremmers (zoals Pantomed of Omeprazole). Meld steeds nieuwe medicatie aan je behandelend hematoloog. Ook het drinken van (grote hoeveelheden) pompelmoessap kan de werking van acalabrutinib verstoren. Probeer dit tot een minimum te beperken. Andere vruchtensappen zijn perfect veilig. Ook Sint-Janskruid (welke gebruikt wordt als plantaardig slaapmiddel) dient vermeden te worden.

Vermijd ook het gebruik van visolie, vitamine E en lijnzaad. Deze verhogen het risico op bloeding.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

Hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 10/06/2022

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier