

Samenstelling van de therapie

Sunitinib (Sutent[®]) is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de 'gerichte medicaties' die selectief inwerken op bepaalde tumoren. De werking bestaat uit het vertragen of stoppen van de ontwikkeling van de tumor door twee basisprocessen te belemmeren die belangrijk zijn voor de groei en zijn verspreiding. Deze twee processen zijn de tumorale celdeling en de tumorale bloedvatvorming.

Verloop van de therapie

Sunitinib wordt éénmaal daags ingenomen via de mond, met of zonder voedsel. Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven. Vaak wordt een dosering van Sunitinib 50mg in een 6-wekelijkse cyclus voorgeschreven. Hierbij neemt u Sunitinib eenmaal per dag gedurende 4 opeenvolgende weken (totaal 28 dagen), gevolgd door een rustperiode van 2 weken (totaal 14 dagen), wat een '4/2 schema' wordt genoemd. Uw arts kan ook kiezen voor een ander innameschema, waarbij u gedurende 2 weken (totaal 14 dagen) Sunitinib eenmaal per dag inneemt, gevolgd door een rustperiode van 1 week (7 dagen), wat een '2/1 schema' wordt genoemd.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)
- Ontstekingen van de mond (pijn, irritatie, pijnlijke zweertjes), klik [hier](#)
- Smaakstoornissen, klik [hier](#)
- Diarree of verandering stoelgangspatroon, klik [hier](#)
- Verhoogde bloeddruk, klik [hier](#)
- Klachten aan handen of voeten (hand-voetsyndroom), klik [hier](#)
- Verkleuring van de huid (geel)

Minder frequente nevenwerkingen

- Verminderde eetlust, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Neusbloeding
- Abnormaal gekleurde urine
- Griepachtige verschijnselen zoals gewrichtspijn, spierpijn en/of hoofdpijn, klik [hier](#)
- Gewichtsverlies

Specifieke richtlijnen

- Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel gebruikt. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Neem Sunitinib niet in met pompelmoessap of Sint-Janskruid. Deze middelen kunnen de normale afbraak van het geneesmiddel in het lichaam tegen gaan waardoor u een hogere blootstelling en dus mogelijk meer bijwerkingen kan ervaren.
- Wanneer u een dosis Sutinib bent vergeten, mag u de vergeten dosis enkel inhalen en innemen als u uw vergetelheid nog dezelfde dag opmerkt. Indien niet slaat u de dosis over en neemt u de volgende dosis op het vaste tijdstip. U neemt dus nooit 2 doses op 1 dag.
- Sunitinib kan een normale wondgenezing verstoren. Het is daarom belangrijk dat u eventuele ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met uw arts bespreekt. Om die reden is het ook belangrijk dat u eventuele wonden toont aan uw arts of verpleegkundige, zodat zij een gepaste verzorging kunnen instellen.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

Contactgegevens Dienst Oncologie

Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman