


Samenstelling van de therapie

Rituximab is een antilichaam gericht tegen een eiwit dat CD20 heet. Dit komt voor op de oppervlakte van B-lymfomen. Toediening van rituximab zorgt ervoor dat deze lymfoomcellen gevoeliger worden aan de effecten van andere celdodende geneesmiddelen. Rituximab trekt ook cellen en eiwitten van het immuunsysteem aan.

Rituximab wordt gebruikt voor de behandeling van lymfomen (lymfeklierkanker) en bepaalde vormen van leukemie.

Rituximab wordt vaak toegediend in combinatie met andere chemotherapie (vb. CHOP of bendamustine). Met spreekt dan respectievelijk van R-CHOP of R-Bendamustine. Soms kan het als geneesmiddel apart worden toegediend.



Figuur: Ritixmab bindt op CD20 en zorgt dat lymfoomcellen kapot gaan.

Verloop van de therapie

Rituximab wordt als intraveneus infuus of onderhuidse inspuiting toegediend. Beide toedieningsmanieren zijn even efficiënt.

De eerste maal dat U het geneesmiddel wordt toegediend, gebeurt dit steeds via een infuus. Het is namelijk noodzakelijk het geneesmiddel de eerste keer heel traag toe te dienen. Dit vermindert de kans op allergische reacties.

Vanaf de tweede maal (in de afwezigheid van allergische reacties) kan rituximab als een onderhuidse inspuiting worden toegediend. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van het type chemotherapie dat U toegediend krijgt.

Alvorens U rituximab wordt toegediend, zowel via infuus of via onderhuidse inspuiting, krijgt U medicijnen toegediend om allergische reacties te vermijden.

Plaats van de toediening

De eerste behandeling wordt toegediend op de hospitalisatie afdeling hematologie (T6). U dient hiervoor 1 nacht te blijven slapen. Daarna kunnen de volgende toedieningen op het oncologisch dagziekenhuis (C6) plaatsvinden.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling T6 of C6.

Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Klik [hier](#) voor de infobrochure van T6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Allergische reacties, klik [hier](#)
- Lage antilichaam concentraties
- Verhoogde gevoeligheid aan infecties

Specifieke richtlijnen

De voornaamste bijwerkingen van rituximab zijn reacties die ontstaan tijdens of kort na het toedienen van het geneesmiddel: de infusie-reacties. Dit zijn een soort van allergische reacties op het geneesmiddel.

De infuusreacties kunnen bestaan uit algemeen onwel gevoel, rugpijn, koorts, rillingen, tranende ogen, kortademigheid, lage bloeddruk, misselijkheid, braken, etc. Daarom wordt gedurende de toediening van rituximab regelmatig de bloeddruk, pols en temperatuur gemeten. Mits het in acht nemen van de correcte infusieduur is de kans op ernstige infuus-reacties vrij klein.

De kans op infusiereacties is ook het hoogst bij de eerste toediening. Daarom duurt het eerste infuus het langst.

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier