

## Samenstelling van de therapie

Pazopanib (Votrient®) is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de 'gerichte medicaties' die selectief inwerken op bepaalde tumoren. Dit geneesmiddel bindt aan de tumorcellen en remt de vorming van bloedvaten die de tumorcellen voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. Zo vertraagt dit geneesmiddel de snelheid waarmee de tumor groeit.

## Verloop van de therapie

Pazopanib (Votrient®) wordt éénmaal daags ingenomen via de mond, telkens rond hetzelfde tijdstip. Pazopanib moet steeds op een lege maag worden ingenomen, dat betekent dat u:

- Twee uur niets meer gegeten heeft op het moment dat u uw dosis Pazopanib inneemt.
- Of u neemt uw dosis Pazopanib in 's ochtens bij het ontwaken.
- Na de inname van Pazopanib wacht u 1 uur alvorens u terug eet.

Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen.

# Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

## Frekwente nevenwerkingen

- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)
- Diarree of verandering stoelgangspatroon, klik [hier](#)
- Verhoogde bloeddruk, klik [hier](#)
- Klachten aan handen of voeten (hand-voetsyndroom), klik [hier](#)
- Verkleuring van het haar (pigmentverlies), klik [hier](#)

## Minder frequente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Griepachtige verschijnselen zoals gewrichtspijn, spierpijn en/of hoofdpijn, klik [hier](#)
- Droge huid en schilferigheid, klik [hier](#)
- Ontstekingen van de mond (pijn, irritatie, pijnlijke zweertjes), klik [hier](#)
- Smaakstoornissen, klik [hier](#)
- Invloed op uw seksualiteit, vruchtbaarheid en/of menstruatie, klik [hier](#)

# Specifieke richtlijnen

- Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel gebruikt. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Neem Pazopanib niet in met pompelmoessap, sterfruit of preparaten op basis van Sint-Janskruid. Deze middelen kunnen de werking van Pazopanib nadelig beïnvloeden.
- Wanneer u een dosis Pazopanib bent vergeten, mag u die inhalen tot 12 uur voor de volgende dosis. Wanneer er minder dan 12 uur is voor de volgende dosis, slaat u de vergeten dosis over. Neem dan de volgende dosis in op het geplande tijdstip. Neem geen dubbele dosis om de gemiste dosis in te halen. Bij een vergetelheid, respecteer de uren voor en na de maaltijd.
- Probeer lactose in de voeding te beperken. In combinatie met de Pazopanib kan dit een nadelig effect hebben op de darmwerking.
- Pazopanib kan een normale wondgenezing verstoren. Het is daarom belangrijk dat u eventuele ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met uw arts bespreekt. Om die reden is het ook belangrijk dat u eventuele wonden toont aan uw arts of verpleegkundige, zodat zij een gepaste verzorging kunnen instellen.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

# Contactgegevens Dienst Oncologie

## Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman